

## ИНВАЗИВНЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ

*Инвазивные растений* - объекты растительного мира, находящиеся за пределами их естественного ареала, распространение и численность которых создают угрозу жизни или здоровью граждан, сохранению биологического разнообразия, причинения вреда отдельным отраслям экономики. Среди инвазивных видов растений, получивших широкое распространение на территории Беларуси, можно выделить группу особо агрессивных. Даная группа видов немногочисленна, но негативный эффект от их распространения существенен. Наиболее яркими представителями являются:

### *Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden)*

- очень крупное (до 3 метров) растение двулетнее или многолетнее семейства Зонтичные. Растение выделяет прозрачный фототоксический сок, который при прикосновении к человеческой коже и под действием ультрафиолетового излучения вызывает ожоги. Борщевик Сосновского представляет угрозу здоровью людей и вызывает экологические проблемы, т.к. из-за быстрого развития популяции, вытесняет другие растения и сохраняет доминирующую позицию на захваченных территориях.

В Беларуси растет по залежам, окраинам полей и обочинам дорог как одичавшее или заносное растение, местами образует большие заросли. В местах обитания практически полностью вытесняет аборигенную растительность, образуя нехарактерные по составу и облику для нашей территории растительные сообщества. Борщевик Сосновского может расти повсеместно, во всех почвенно-климатических зонах республики. Чаще всего он встречается вдоль дорог (начиная от крупных автомагистралей, заканчивая мелкими лесными дорожками), а также участках, примыкающих к ним (кюветы, откосы и др.)



Для борьбы с борщевиками существуют различные методы:

- ручное или механическое выкапывание стеблекорней;
- выкашивание;
- стравливание путем выпаса скота;
- использование гербицидов;
- запашка и посев травосмесей или посадка лесных культур.

### ***Золотарник канадский (Solidago canadensis L.)***

- многолетнее травянистое растение высотой 50-200см. Стебли прямостоячие, опушенные. Листья очередные. Цветки желтые, собраны в метельчатое соцветие. Плоды - цилиндрические семянки. Цветет в июле-сентябре, семянки созревают в августе - октябре.



***Золотарник канадский*** - аллергенное агрессивное растение, каждая особь продуцирует более 20000 семян (всхожесть которых составляет 5090%), которые несут угрозу здоровью людей, повышая уровень заболеваемости, так как пыльца золотарника провоцирует у людей аллергические реакции. В последние годы эта опасность возросла, данный вид значительно увеличил свою численность (в среднем на 15-20%), ареал распространения, что приводит к трансформациям природных комплексов. Основной центр распространения - 50-километровая зона вокруг города Минска).

Меры борьбы:

- скашивание;
- перекапывание почвы в летнее время при отсутствии осадков;
- использование гербицидов;
- запрет на использование данного растения в озеленении.

### ***Эхиноцистис лопастной (Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray.)***

- один из наиболее агрессивных и активно расселяющихся инвазивных

видов, практически ежегодно увеличивающий площадь своего распространения на 40-50%.

Эхиноцистис однолетнее однодомное травянистое растение. Цветение в июле - сентябре, плодоношение с августа, причём, красиво цветут, только мужские особи. Женские имеют более скромные соцветия и сразу у них появляются колючки. Культивируется как декоративное растение. Встречается в населенных пунктах, среди кустарников, по берегам водоемов. Произрастает на пустырях и в кустарниках около жилья, в садах, дачных посёлках, по прибрежным кустарникам вдоль рек. Поскольку прекращение выращивания в декоративных целях приведет к заметному сокращению инвазионных популяций, стратегия борьбы с данным видом должна быть



сосредоточена на просветительской работе среди населения и запрете выращивания и использования в озеленении. Эхиноцистис можно выпалывать, и на ограниченных площадях он может быть быстро уничтожен.

#### Меры борьбы:

- выпалывание;
- запрет на использование данного растения в озеленении.

### ***Клен ясенелистный (Acer negundo L.)***

- дерево до 25 м высотой и в диаметре до 50 см, с широкой развесистой кроной, с серой или темно-серой корой. Очень активен и подвижен, обладает высокой скоростью роста и устойчив к загрязнению воздуха. Оказалось, что его опавшая листва настолько едкая, что вытесняет дубравы. Поселяется в

окрестностях городов и поселков сначала на нарушенных местах, но вскоре внедряется и в природные сообщества. Процесс расселения идет сравнительно быстро, так как в стадию плодоношения он вступает уже в возрасте 6-7 лет, и смена его поколений происходит быстрее, чем у других видов деревьев.

В городских условиях - злостный древесный сорняк. Пыльца мужских экземпляров клёна ясенелистного является сильным аллергеном, в период весеннего цветения ветер разносит её на большие расстояния, а её присутствие в воздухе вызывает у людей поллинозы (заболевание, называемое «сенной лихорадкой»). Учёным известно, что при наличии хорошего ветра кленовые семена, напоминающие в полёте маленькие вертолёты, способны улететь на расстояние более километра от родного дерева. По исследованиям, является канцерогеном. Листья при растирании издают неприятный запах.



Меры борьбы:

- запрет на использование данного растения в озеленении;
- удаление деревьев, находящихся в ненадлежащем (аварийном) состоянии.

***Робиния лжеакация (Robinia pseudoacacia L.)***

- крупные деревья высотой 20-25 м (может достигать 30-35 м) и диаметром ствола до 1 м. Крона ажурная, раскидистая, широкоцилиндрическая, на вершине закругленная, просвечивающая, с несколькими обособленными ярусами облиственных ветвей. Корневая система глубокая, разветвляющаяся, диаметром 12-15 м, на корнях находятся

клубеньки с азотофиксирующими бактериями. Кора на стволе толстая, растрескивающаяся, серо-бурого цвета, с глубокими продольными трещинами. Цветет в мае-июне.

Растет быстро, особенно до 10 лет, ежегодно прирост в высоту 60-80 см, в ширину 20-30 см. Развивает глубокую и мощную корневую систему; дает поросль от пня и корневые отпрыски. Очень светолюбива и засухоустойчива. Произрастает на любых почвах, предпочитает легкие и плодородные, не выносит уплотнения. Выдерживает довольно значительное засоление.



Меры борьбы с робинией лжеакацией направлены, в первую очередь, на ограничение распространения проростков.

Меры борьбы:

- Запрет на использование данного растения в озеленении;
- Удаление деревьев, находящихся в ненадлежащем (аварийном) состоянии.

На территории лесного фонда Василевичского лесхоза инвазивных видов, таких как Борщевик Сосновского и Золотарника канадского не обнаружено. Последний очаг Борщевика Сосновского был ликвидирован в 2016 году.

### Мониторинг инвазивных видов в 2021 году

Лесничество	квартал	выдел	площадь, га	инвазивный вид	проведенные мероприятия в 2021 году
Василевичское	10	3	8,0	робиния лжеакация	скашивание
Василевичское	13	1	4,5		скашивание
Лисковское	30	6,7,14-18	1,8		скашивание
Макановичское	12	68	0,4		скашивание
Макановичское	12	64	0,3		скашивание
Новинковское	34	32	1		скашивание

**Не используйте инвазивные виды растений при благоустройстве и озеленении на приусадебных участках и территориях, прилегающих к жилым домам и организациям.**

**В случае выявления инвазивных видов растений на территории лесного фонда Василевичского лесхоза просьба сообщить в отдел лесного хозяйства по телефону 8т02340 4-70-14.**